



## FACETDENERVATIE – FACETINFILTRATIE

### WAT IS EEN FACETINFILTRATIE/FACETDENERVATIE?

Een infiltratie is een inspuiting ter hoogte van de wervelkolom om specifieke rugklachten te behandelen. Hierbij injecteert men corticoiden en/of pijnstillende vloeistoffen in de epidurale ruimte. De verschillende pijnlijke gewrichten in de rug kunnen hierdoor worden behandeld.



Een denervatie is hetzelfde, maar hierbij wordt ook het gewrichtszenuwtje gebrand.

### DOEL

Ter verlichting van lage rugpijn of halspijn. De corticoiden of facetdenervaties kunnen ontstekingen en zwellingen verminderen.

### VOORBEREIDING

De inname van antistollingsproducten/bloedverdunners **STOPT** u 7 dagen voor de behandeling, bv. Marcoumar, Sintrom, Plavix, Ticlid. Eventueel vervangende inspuitingen (Clexane, Fraxodi,...) mogen tot daags voordien gegeven worden (niet op de dag zelf). Cardio-aspirine of Asaflo vormen geen probleem.

### DE DAG VAN DE BEHANDELING

U meldt zich aan de balie van het onthaal en de opnamedienst van het ziekenhuis voor inschrijving met uw SIS-kaart. U zal op de daghospitalisatie verblijven voor en na de behandeling. U krijgt daar tijdens uw verblijf een bed toegewezen. U komt aan de beurt in de loop van de voormiddag of namiddag dat u bent opgenomen.

## **VERLOOP VAN UW VERBLIJF**

---

U wordt met een bed naar het operatiekwartier gebracht. Daar krijgt u een infuus van de anesthesist. Tijdens deze ingreep ligt u op uw buik. De behandeling duurt ongeveer 15 minuten. De prikplaats wordt ontsmet en afgedekt met een verband.

Na de infiltratie/denervatie verblijft u nog even in de ontwaakkamer ter observatie. Daarna wordt u terug naar de kamer gebracht.

U blijft 2 uur ter observatie in het ziekenhuis zodat mogelijke nevenwerkingen kunnen worden nagegaan, bv. huiduitslag, hoofdpijn. Uw dagverblijf duurt ongeveer 4 uur. Voordat u naar huis gaat, krijgt u een pijnstiller voor de avond mee.

## **NA DE BEHANDELING**

---

De dokter brengt het verslag over naar uw dokter, die u doorverwezen heeft. De dokter komt niet meer op de kamer tenzij er specifieke informatie doorgegeven moet worden.

Na 24 uur mag het verband eraf en kan u baden.

De eerste 12 uren heeft u relatieve rust thuis. Lichte pijnstiller, type paracetamol, neurofen, ibuprofen kan u verder thuis innemen.

Het effect van uw behandeling is pas voelbaar na 2 tot 3 weken. U zal 1 tot 2 dagen werk onbekwaam zijn.

## **EVENTUELE NEVENWERKINGEN**

---

Ernstige en blijvende complicaties zijn uiterst zeldzaam (1/80000). Tijdelijke hoofdpijn gedurende 1 of 2 weken is zeldzaam (1/200). Soms kan de rugpijn gedurende enkele dagen wat toenemen.

Bij het verlaten van het ziekenhuis

U mag zelf nog geen voertuig besturen omwille van een mogelijk slap gevoel in de ledematen. U laat zich best begeleiden. U neemt thuis uw pijnmedicatie verder en rust uit.

De dag nadien hervat u de normale bezigheden. Het suikergehalte van patiënten met diabetes kan tijdelijk ontregeld zijn en kan door de huisarts worden opgevolgd.

Hebt u vragen, contacteer dan een verpleegkundige van de afdeling. De arts die u deze behandeling heeft voorgeschreven zal u verder opvolgen.

## **BIJ ONVERWACHT PROBLEEMEN**

---

016/209 254 (daghospitalisatie tot 17 uur)

016/209 280 (spoedgevallen na 17 uur)