

Oorzaak:

Onder de huid van de handpalm ligt een peesblad met uitlopers naar de vingers toe. Bij de ziekte van Dupuytren vermeerderen de cellen in dit peesblad zich en raken overactief waardoor ze meer en stugger bindweefsel maken. Hierdoor ontstaan eerst bindweefselknopen in de hand, die zich geleidelijk vormen tot strengen. Deze strengen kunnen inkorten waardoor de vingers krom komen te staan en niet meer recht kunnen. Dit komt vooral in de pink en ringvinger voor. De aandoening is vaak erfelijk en komt meer bij mannen voor.

Klachten:

Er is een toenemende strengvorming en krom staan van de vingers. Dit zorgt voor hinder in het gebruik van de hand. Meestal is de aandoening niet pijnlijk. De klachten kunnen ook in de voeten en penis voorkomen. Soms zijn er zwellingen over de knokkels. Indien de beperking te groot wordt kan gekozen worden voor behandeling.

Behandeling:

Het geneesmiddel Xiapex (Collagenase) lost via inspuiting de strengen op. U krijgt de inspuiting op raadpleging. Na 24 tot 48 uur heeft u een tweede afspraak op de kleine ingrepen zaal waarbij de streng doorgetrokken wordt. Als nodig gebeurt dit onder lokale verdoving. Er is via het RIZIV een vergoeding van 2 spuitingen per hand per 2 jaar voorzien. Er kunnen dus maximaal 2 strengen gelijktijdig behandeld worden. De inspuiting mag alleen verricht worden door een ervaren handchirurg.

Nabehandeling:

U krijgt voor korte tijd een verband. Daarna krijgt u een stretch spalk die de vinger recht houdt. Door de ontstane verkorting in huid, gewrichtsbanden en pezen heeft de vinger namelijk de neiging terug te plooiën. Deze brace moet de eerste 3 weken overdag om de 2 uur aan en af gedragen worden. Voor de nacht moet de brace aan. Tussen 3 en 6 weken is de brace alleen nog maar 's-nachts nodig.

Resultaat operatie:

In een ruime meerderheid is er een goed resultaat. De ziekte van Dupuytren is echter onvoorspelbaar in beloop en resteren of terugkeren van samentrekking wordt regelmatig gezien maar is meestal niet ernstig genoeg voor nieuwe behandeling.

Risico's operatie:


Frequente bijwerkingen van de inspuiting en doorbewegen van de vinger zijn lokale reacties (pijn, zwelling, jeuk, bloeding, bloeditstorting). Heel zeldzaam is een allergische reactie. Het risico op inscheuren van de huid als deze aan de streng verbakken is ongeveer 8%. Deze wonden helen vanzelf met wondzorg.

Bijzonderheden:

Indien u bloedverdunders gebruikt moet u hier 5-10 dagen op voorhand mee staken. Dit kunt u best in overleg met uw huisarts doen.



In de 1^e fase ontstaan er zwellingen in de handpalm: noduli. Deze kunnen zich vormen tot strengen in de 2^e fase. Deze strengen kunnen samentrekken waardoor de vingers niet meer recht kunnen komen.



Op de eerste afspraak wordt een inspuiting in de streng gegeven.



24-48 uur na de inspuiting wordt op de kleine ingrepenzaal de vinger recht gebogen. Zo nodig wordt dit gedaan onder lokale verdoving.